

NEMATOIDES

- *Pratylenchus* spp. - Nematoides das lesões
- *Meloidogyne* spp. - Nematoides das galhas



Associação Brasileira da Batata

Pratylenchus spp

Este nematoide provoca pintas na pele dos tubérculos.


A ocorrência esta aumentando em todas as regiões produtoras devido ao fato deste nematoide possuir um número muito grande de plantas hospedeiras.

Apesar de geralmente não causar danos severos, as “pintinhas” desvalorizam a batata.



Associação Brasileira da Batata

Pratylenchus spp.




Associação Brasileira da Batata

Pratylenchus spp




Associação Brasileira da Batata

Pratylenchus spp.




Associação Brasileira da Batata

Pratylenchus spp.



Associação Brasileira da Batata

Pratylenchus spp.



Associação Brasileira da Batata

Meloidogyne spp.

Este nematoide provoca danos severos nos tubérculos.

As perdas provocadas tem sido elevadas, as vezes até 100%.

Os tubérculos afetados ficam empipocados e por isso o sintoma é popularmente citado como “pipoca”.



Associação Brasileira da Batata

Meloidogyne spp.



Associação Brasileira da Batata

Meloidogyne spp.



Associação Brasileira da Batata

Meloidogyne spp.



Associação Brasileira da Batata

Meloidogyne spp.



Associação Brasileira da Batata